
VAUTOUR MOINE



Le **Vautour moine** (*Ægypius monachus*) affectionne particulièrement les flancs de collines, les falaises escarpées ou les zones rocailleuses mais peut néanmoins vivre en plaine, sur des plateaux ou dans des montagnes boisées.




Ægypius monachus

Sa grosse tête, de couleur gris claire avec des zones de peau bleuâtres, est dénudée sur le dessus, évoquant une sorte de « tonsure » lui valant son nom de vautour moine. Utilisant les ascendances thermiques avec une très grande aisance, il profite les heures les plus chaudes de la journée pour se nourrir. Particulièrement adapté au vol plané, il peut prospecter de longues heures mais est cependant incapable d'effectuer un vol battu sur de grandes distances.



Milieu typique pour découvrir le Vautour moine :
les gorges et canyons



RÉSEAU **BIO-SCÈNE.ORG**
FAIRE CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ

RÉPARTITION



Source - Iucn

STATUT :

Les opérations de réintroductions sont menées avec succès depuis de nombreuses années, notamment dans le sud de la France (Tarn, Verdon et Baronnies).

Très menacée à l'échelle européenne et inscrite sur la liste rouge de la faune menacée en France dans la catégorie «vulnérable», cette espèce bénéficie actuellement de multiples mesures de conservation, principalement en Espagne, en France et dans les Balkans.

EN SAVOIR PLUS

Liens utiles et sources :

[Collection Bio-Scène](#)

[Wikipedia](#)

[Oiseaux.net](#)

[Iucn](#)

[Xeno-Canto](#)

FAMILLE : ACCIPITRIDAE

Les *Accipitridae* (ou *Accipitridés*) sont une famille de rapaces diurnes.

Celle-ci comprend 67 genres et 254 espèces (source [Catalogue of life](#)).



DESCRIPTION DE L'ESPÈCE :

Il est, avec le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*), le plus grand rapace d'Europe. Son plumage est entièrement brun sombre et ses pattes sont gris clair. Ses ailes, beaucoup plus longues et larges que celles du vautour fauve, ont des bords parallèles et des extrémités nettement digitées. Les juvéniles ont la tête recouverte d'un duvet brun, leur plumage est très sombre, et ils n'auront leur plumage adulte qu'à l'âge de 6 ans.



ALIMENTATION :

Sur la curée il est dominant par rapport aux autres vautours, néanmoins, le plus souvent, il attend et se nourrit, après les vautours fauves, des parties dures, tendons, peaux ou cartilages qu'ils ont laissées. Il peut aussi exceptionnellement, lorsque les cadavres deviennent rares, se nourrir de petites proies vivantes, comme des lapins ou écureuils.



COMPORTEMENT :

Beaucoup moins sociables que les vautours fauves, ils vivent en couples ou en petits groupes lâches. Son domaine s'étend sur plusieurs dizaines de Km² et chaque couple défend son propre territoire sur un périmètre d'au moins 100 mètres autour du nid. Il parcourt le plus souvent seul son territoire à la recherche de nourriture mais aussi quelquefois en couple ou avec des vautours fauves (*Gyps fulvus*) ou percnoptères (*Neophron percnopterus*).

